

Repliderm *Terbinafina 1%*

Crema 1% - Uso Externo

VENTA LIBRE

¿Qué contiene REPLIDERM?

REPLIDERM tiene 1 gramo de Terbinafina clorhidrato cada 1 gramo de crema.

Otros componentes de la crema: alcohol cetosteárico; cetomacrogol 1000; vaselina líquida; vaselina sólida; alcohol bencílico; hidróxido de sodio; agua purificada c.s.p. 100 g.

ACCIONES:

Antimicótico.

¿Para qué se usa REPLIDERM?

REPLIDERM está indicado para el tratamiento del pie de atleta y para las infecciones de la piel causadas por hongos ubicados en ingles, manos y axilas.

Estas afecciones, generalmente se manifiestan a través de síntomas tales como picazón, ardor, sudoración, mal olor, sequedad, despellejamiento, salpullido y ulceración.

¿Qué personas NO pueden recibir REPLIDERM?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a la Terbinafina o a alguno de los ingredientes de la fórmula.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar REPLIDERM?

Repliderm está indicado sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos. No aplicar en cuero cabelludo, boca, ojos ni afecciones vaginales.

Pacientes geriátricos: este producto puede ser utilizado en ancianos sin modificar la dosis y el tiempo de tratamiento.

Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando REPLIDERM?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como enrojecimiento y prurito en el punto de aplicación, sin embargo raramente el tratamiento debe ser interrumpido por estas razones.

Consulte a su médico en caso de que aparezcan reacciones adversas no descritas en el prospecto.

¿Cómo se usa REPLIDERM?

Adultos y mayores de 12 años: este producto debe ser aplicado una vez al día.

- Limpie y seque con cuidado las zonas donde será aplicada la crema.

- Aplique una capa fina de crema sobre la zona afectada y sobre el área cercana y friccione delicadamente.

Duración del tratamiento: en general la duración del tratamiento tópico es la siguiente:

- Pié de atleta: 1 semana, aplicando el producto una vez al día.

-Manos, pies (pasar entre los dedos) y axilas: de 1 a 2 semanas, aplicando el producto una vez al día.

Generalmente a los pocos días del inicio del tratamiento la sintomatología suele disminuir, continúe normalmente la aplicación por el tiempo recomendado (ver más arriba para cada afección).

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas

Tel.: (011) 4654 6648

Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)

Tel.: (011) 4961 8447

¿Tiene usted alguna pregunta?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT PHARM S.A. al teléfono 0810-444-32267.

También puede hacerlo a ANMAT responde, al teléfono 0800-333-1234.

CONSERVACIÓN:

Conservar a una temperatura menor a 30° C.

PRESENTACIÓN:

Envases conteniendo 1 pomo con 15 g.