

# Motional Lax

## Picosulfato de Sodio

Cápsulas blandas - Vía oral

**Venta libre**

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN  
ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

En este Prospecto:

**1 - ¿Qué contiene MOTIONAL LAX?**

**2 - ¿Cuál es la función de MOTIONAL LAX?**

**3 - ¿Para qué se usa MOTIONAL LAX?**

**4 - ¿Qué personas no pueden recibir MOTIONAL LAX?**

**5 - ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar MOTIONAL LAX?**

**6 - ¿Qué cuidados debo tener mientras**

**estoy tomando MOTIONAL LAX?**

**7 - ¿Cómo se usa MOTIONAL LAX?**

**8 - ¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria de MOTIONAL LAX?**

**9 - ¿Tiene usted alguna consulta acerca de MOTIONAL LAX?**

**10 - Presentaciones de MOTIONAL LAX.**

**11 - Modo de conservación de MOTIONAL LAX.**

### **1. ¿Qué contiene MOTIONAL LAX?**

Principio activo: Picosulfato de Sodio 5,0 mg. Excipientes: Polietilenglicol 400 152,1 mg; Propilenglicol 3,6 mg; Polivinilpirrolidona 0,9 mg; Agua purificada 14,4 mg; Metilparabeno sódico 0,376 mg; Propilparabeno sódico 0,075 mg; Solución de Sorbitol 23,2 mg; Agua purificada 11,5 mg; Gelatina bovina 200bloom 99,64 mg; Glicerina bidestilada 23,2 mg; Colorante azul brillante fd&c n°1 (CI 42090) 0,016 mg.

### **2. ¿Cuál es la función de MOTIONAL LAX?**

Laxante.

### **3. ¿Para que se usa MOTIONAL LAX?**

MOTIONAL LAX está indicado para el tratamiento de la constipación ocasional, una vez que se ha intentado con modificaciones de la dieta y el estilo de vida y estas medidas no han dado resultado.

MOTIONAL LAX es un medicamento que se utiliza para el tratamiento sintomático del estreñimiento en adultos y niños mayores de 12 años.

MOTIONAL LAX es un laxante de contacto que modifica el intercambio hidroeléctrico intestinal y estimula la motricidad colónica. Su acción laxante se produce en un plazo de 8 a 12 horas luego de su administración.

### **4. ¿Qué personas no pueden recibir MOTIONAL LAX?**

No tome este medicamento si usted:

- Es alérgico a alguno de los principios activos.

- Está embarazada o amamantando.

- Tiene enfermedades del intestino como obstrucción intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, entre otras.

- Presenta cuadros de dolor abdominal que no tengan diagnóstico.

- Tiene un bolo fecal (ampolla rectal ocupada por materia fecal organizada).

- Si el paciente es menor de 12 años.

### **5. ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar MOTIONAL LAX?**

Tener en cuenta si usted:

- Es alérgico (hipersensible) a alguno de los componentes del medicamento.

- Es niño menor de 12 años.

- Tiene dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos.

- Presenta obstrucción intestinal.

- Sufre colonopatías orgánicas complementarias (enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerosa).

- Presenta perforación gastrointestinal y hemorragia rectal sin diagnosticar.

- Sufre de hipocalcemia o hipocalcemia.

- Está tomando algún medicamento, especialmente antiarrítmicos (tipo quinina, sotalol, amiodarona, vincamina, digitálicos) o drogas hipocalémiantes (anfotericina B, corticoides y diuréticos hipocalémiantes solos y asociados).

- Está embarazada o dando de mamar.

- En cuanto a la conducción y uso de maquinarias, no se han realizado estudios sobre el efecto de MOTIONAL LAX.

Este medicamento por contener glicerina como excipiente, puede ser perjudicial a dosis elevadas, puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Por contener Metilparabeno y propilparabeno como excipientes, en raras ocasiones pueden dar reacciones inmediatas de urticaria y broncoespasmo. Por contener Sorbitol, puede causar molestias de estómago y diarrea.

### **6. ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando MOTIONAL LAX?**

Al igual que todos los medicamentos, el Picosulfato de sodio puede producir efectos adversos, aunque no todos los pacientes los experimentan.

Se pueden presentar molestias gástricas, diarrea o cólicos abdominales especialmente en pacientes con

colon irritable.

El uso prolongado o una sobredosis puede provocar diarrea con pérdida excesiva de agua y electrolitos, particularmente potasio; desarrollo de un colon atónico no funcionante.

El uso excesivo de laxantes puede producir situación de dependencia que requiere de ingesta regular de laxantes y aumento de la posología en caso de estreñimiento severo. También puede provocar la aparición de colopatía funcional severa con alteración de la mucosa intestinal.

**Efectos adversos muy frecuentes** (pueden afectar al menos 1 de cada 10 pacientes):

- Diarrea

**Efectos adversos frecuentes** (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):

- Cólicos, dolor abdominal, molestias abdominales.

**Efectos adversos poco frecuentes** (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- Vómitos, náuseas y mareos.

**Efectos adversos de frecuencia no conocida** (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):

- Hipersensibilidad (reacciones alérgicas), angioedema (inflamación que se produce bajo la superficie de la piel), reacciones en la piel, erupciones en la piel, hinchazón de la piel o de las mucosas (exantema), picor y síncope.

Los mareos y síncope que aparecen después de la administración de picosulfato de sodio parecen ser consecuentes con una respuesta vasovagal (p. ej. a un espasmo abdominal, defecación).

## 7. ¿Cómo se usa MOTIONAL LAX?

Dosis recomendada:

**Niños mayores de 12 años y Adultos:** tomar 1 a 2 cápsulas (5 a 10 miligramos de Picosulfato de sodio) por la noche, antes de acostarse para producir la evacuación a la mañana siguiente.

MOTIONAL LAX, cápsulas blandas de 5 mg, puede mezclarse con cualquier tipo de alimento o bebida.

No es necesario ningún tipo de medida dietética especial para poder tomar este medicamento.

Las cápsulas blandas deben tragarse enteras, sin masticar y con un vaso de líquido.

Se recomienda comenzar con la dosis más baja (5 miligramos de Picosulfato de sodio). La dosis puede ajustarse hasta llegar a la dosis máxima recomendada (10 miligramos de Picosulfato de sodio) para lograr deposiciones regulares. No debe excederse la dosis diaria máxima recomendada.

SI LOS SÍNTOMAS (constipación) PERSISTEN POR MÁS DE 48 HORAS O EMPEORAN CONSULTE A SU MÉDICO.

## 8. ¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria de MOTIONAL LAX?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

**Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez**

**Tel: (011) 4962-6666/2247**

**Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna)**

**Tel: (011) 4300-2115**

**Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof.**

**A. Posadas**

**Tel: (011) 4654-6648/4658-7777**

**Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)**

**Tel: (011) 4961-8447**

**9. ¿Tiene usted alguna consulta acerca de MOTIONAL LAX?**

Laboratorio SAVANT PHARM S.A., Tel.: 0810-444-32267.

## 10. Presentaciones de MOTIONAL LAX:

Estuche conteniendo 20 cápsulas blandas.

## 11. Modo de conservación de MOTIONAL LAX:

Mantener en su envase original, en lugar seco, al abrigo de la luz y a una temperatura entre 15 y 30 °C. No utilizar este medicamento después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

## MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificacion.asp>

o llamar a ANMAT responde al 0800-333-1234

1008137

Emisión: 07/19

Revisión: 04/22

SAVANT PHARM S.A.

Complejo Industrial RN N° 19, Km 204

Córdoba, CP: X2432XAB

Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico E.M.A.M.S. Certificado N° 58.988

Elaborado en Argentina

En Bolivia: Importado y Distribuido por HANSA LTDA.

R.S. II-77219/2021. Venta bajo receta médica.

En Paraguay: Importado por Savant Pharm Paraguay

S.A., Benjamín Constant 835, Asunción, Paraguay.

Regente Farm. Lidia Flor Luna R.P. N° 2.982.

Autorizado por D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

Cert. N° 25996-01-EF.

☎ 0810-444-32267

🌐 [www.savant.com.ar](http://www.savant.com.ar)

**SAVANT**