

Gripaben ALLER

CETIRIZINA DICLORHIDRATO 10 mg



Cápsulas blandas
Vía de administración: Oral

Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

¿Qué contiene GRIPABEN ALLER?

Cada cápsula blanda contiene Cetirizina Diclorhidrato 10 miligramos.

Excipientes: Polietilenglicol 600; Hidróxido de Potasio; PVP K30 USP; Gelatina; Glicerina destilada; Metilparabeno sódico; Propilparabeno sódico; Sorbitol solución 70%; Colorante verde FD&C N°3 (CI 42.053); Agua purificada.

Acción:

Antialérgico.

Código ATC: R06AE07

¿Para qué se usa GRIPABEN ALLER?

Está indicado para el alivio temporario de los síntomas de la rinitis alérgica tales como secreción nasal, picazón en los ojos, nariz y/o garganta, lagrimeo, estornudos. En alergias de la piel que se manifiestan por picazón y enrojecimiento de la piel.

¿Qué personas no pueden recibir GRIPABEN ALLER?

No use este medicamento:

- Si tiene hipersensibilidad a la cetirizina diclorhidrato, a cualquiera de los componentes de la fórmula, a la hidroxidizina o a derivados de la piperazina.
- Si tiene insuficiencia renal grave con clearance de creatinina menor a 10 ml/min (ya que la cápsula no puede ser fraccionada a la mitad).

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con GRIPABEN ALLER:

- Si es epiléptico o tiene riesgos de sufrir convulsiones.
- Si tiene problemas renales.
- Si está embarazada o amamantando.
- Si recibe algún otro medicamento.
- Si tiene intolerancia a la fructosa.
- Si es menor de 12 años.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Como todos los medicamentos GRIPABEN ALLER puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran, entre los más frecuentes se incluyen fatiga, sequedad de boca, malestar, mareos, dolor de cabeza, somnolencia, dolor de garganta y molestias al tragar. Poco frecuentes, debilidad, malestar general, hormigueo o entumecimiento de manos o pies, agitación, prurito, sarpullido, diarrea o dolor de estómago. Consulte con su médico si usted advierte alguno de estos síntomas.

En la mayoría de las personas este producto no causa somnolencia, sin embargo, hay excepciones y debe ser cuidadoso cuando utilice este medicamento por primera vez. Si este medicamento le genera somnolencia, no maneje ni utilice maquinarias.

Al igual que con todos los antihistamínicos es aconsejable evitar el consumo de alcohol cuando se esté utilizando este medicamento.

En el caso de tener que realizar una prueba de alergia cutánea, debe suspender este medicamento tres días antes, ya que los antihistamínicos pueden afectar los resultados de los test.

¿Cómo se usa este medicamento?

Vía de administración: Oral

Dosis para adultos y mayores de 12 años: tome con agua 1 cápsula por día.

No tome más de una cápsula en 24 horas. No mastique la cápsula.

Pacientes con insuficiencia renal: su médico le indicará cual es la dosis adecuada para su tratamiento.

Si usted se olvidó de tomar la medicación, puede tomarla tan pronto como sea posible, pero recuerde esperar 24 horas antes de tomar la próxima cápsula blanda.

La duración del tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos, salvo que el médico indique continuar con el tratamiento.

Ante cualquier duda consulte a su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

- **Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247

- **Hospital A. Posadas:** (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777

- **Centro Nacional de Intoxicaciones:** 0800-333-0160.

Conservación:

Conservar en su envase original a temperatura ambiente, no mayor de 30°C.

Presentación:

Envases conteniendo 10 cápsulas blandas.

¿Tiene usted alguna pregunta?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT PHARM S.A. al teléfono 0810-444-32267.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACEUTICO.**

1007344

Emisión: 08/20

Revisión: 07/20

SAVANT PHARM S.A.

Complejo Industrial RN N° 19, Km 204

Córdoba, CP: X2432XAB

Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado N° 59.246

Elaborado en Argentina

☎ 0810 - 444 - 32267

🌐 www.savant.com.ar

The logo for SAVANT features the word "SAVANT" in a bold, black, sans-serif font. To the left of the text is a stylized graphic element consisting of three curved lines that suggest a flame or a drop, positioned above the letter 'A'.